

**URGENTE Y PRIVADO**  
**INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE SU SALUD**  
**INSTRUCCIONES PARA PAREJAS SEXUALES DE COMO TOMAR**  
**AZITROMICINA**

POR FAVOR LEA ESTO CON MUCHO CUIDADO

Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento contra la *Clamidia*. La *Clamidia* es una infección bacteriana curable que se puede contagiar por haber tenido sexo con una persona que ya la tiene. Muchas personas que tienen *Clamidia* no saben que la tienen porque no presentan síntomas y se sienten bien. Otras personas pueden desarrollar dolor en la pelvis o en los testículos, dolor al orinar o durante el sexo. Sin embargo, si usted no toma medicinas para curarla podría sentirse muy enfermo. Si usted tiene sexo sin protección con su pareja, usted también puede reinfectarlo(a). Las mujeres pueden llegar a ser estériles si no reciben tratamiento.

Usted podría tener *Clamidia*. Es importante que reciba tratamiento. Nosotros queremos asegurarnos que usted reciba la medicina necesaria lo más pronto posible. La mejor forma de cuidarse es ver a un médico o venir a: \_\_\_\_\_ número de teléfono: \_\_\_\_\_ para que lo examinen y le receten la medicina. Si usted no puede ver a un médico dentro de una semana, usted debe tomar la medicina que incluimos o que le han recetado lo más pronto posible.

**Por favor lea lo siguiente antes de tomarse la medicina:**

La medicina es segura. Sin embargo, **si algo de lo siguiente es cierto, NO LA TOME (USTED TIENE QUE VER PRIMERO A UN MEDICO):**

- Si es mujer y tiene dolor en el vientre o mientras tiene sexo, tiene fiebre o vómitos.
- Si está embarazada.
- Si es hombre y está teniendo dolor en los testículos o los tiene hinchados
- Si ha tenido una mala reacción, salpullido o alergia a los siguientes antibióticos: Azithromycin (“Zithromax”), Erythromycin, Clarithromycin (“Biaxin”)
- Si padece de una seria y larga enfermedad en los riñones, corazón o hígado.
- Si actualmente está tomando otra medicina recetada.

Si alguna de estas circunstancias existe usted debe hablar con su proveedor de cuidados médicos lo más pronto posible.

Pase a la siguiente página -----

Algunas personas pueden tener un leve malestar estomacal o diarrea después de tomar esta medicina. Otras pueden sentir mareos, fatiga o dolores de cabeza; infección vaginal por hongos, salpullido o tener más sensibilidad a la luz solar, estos no duran mucho. Si usted experimenta cualquier otro efecto secundario, llame inmediatamente a su proveedor de cuidados médicos. Puede tener otros efectos secundarios más severos pero son casos extremadamente raros.

No comparta o le dé esta medicina a nadie más.

No tenga sexo por los próximos 7 días después de terminar la medicina. La medicina toma 7 días para curar la *Clamidia*. Si usted tiene sexo sin protección durante los 7 días después de haber tomado la medicina, todavía puede pasarle la infección a su pareja sexual. Aunque los condones o profilácticos son efectivos, la forma más segura no pasarle la infección a alguien más es no tener sexo por 7 días después de terminar el tratamiento.

Si usted tiene cualquier pregunta sobre el medicamento o la *Clamidia*, por favor llame al: \_\_\_\_\_.

Todas las llamadas son confidenciales. Nadie le preguntará su nombre.